

## CRITERIOS DE PRUEBAS PARA SARS-COV-2 (COVID-19)

HASTA QUE SE AUMENTEN LOS SUMINISTROS DE PRUEBA Y LA CAPACIDAD DEL LABORATORIO, LA ATENCIÓN AMBULATORIA SEGUIRÁ ESTAS RECOMENDACIONES

### SE DEBE REALIZAR PRUEBAS DEL COVID-19 PARA ESTOS PACIENTES

Pacientes con fiebre y tos o falta de aire que están:

- Hospitalizados con enfermedad grave de las vías respiratorias inferiores
- Trabajadores de la salud
- Trabajadores en otras ocupaciones de seguridad pública (por ejemplo, aplicación de la ley, bomberos, servicios médicos de emergencia)
- Involucrados en un grupo de enfermedades en una instalación o institución (por ejemplo, atención médica, escuela, establecimiento correccional, personas sin hogar / refugios, otras instituciones / congregaciones) o pacientes con insuficiencia orgánica (ICC, EPOC, cirrosis, insuficiencia renal, etc.)

### SE DEBE REALIZAR PRUEBAS DEL COVID-19 PARA ESTOS PACIENTES, DESPUÉS DE COMUNICARSE A UN PROVEEDOR DE ATENCIÓN MÉDICA

Pacientes con fiebre y tos o falta de aire que:

- Son mayores de 60 años
- Tienen otros padecimientos
- Están embarazada

### NO ES NECESARIO REALIZAR PRUEBAS PARA PERSONAS MÁS JOVENES Y SALUDABLES CON ENFERMEDAD LEVE

Estas personas deben permanecer en casa por 7 días, o 72 horas después de que se resuelvan los síntomas, cualquier de los dos que sea más largo. **No es necesario hacerse las pruebas a los pacientes asintomáticos.**

| Características clínicas   | Factores de riesgo   | ¿Prueba para el SARS-CoV-2? |
|--|--|-----------------------------|
| Asintomático   |  | No                          |
| Síntomas de infección respiratoria aguda (es decir, fiebre, nueva tos, nueva dificultad para respirar, mialgias, etc.) pero no requiere hospitalizarse | Ninguno  | Utilice el juicio clínico   |
| Síntomas de infección respiratoria aguda (es decir, fiebre, nueva tos, nueva dificultad para respirar, mialgias, etc.) pero no requiere hospitalizarse | Poblaciones especiales*  | Sí                          |
| Síntomas de infección respiratoria aguda (es decir, fiebre, nueva tos, nueva dificultad para respirar, mialgias, etc.)                                 | Cualquiera de las siguientes actividades en los últimos 14 días antes del inicio de los síntomas: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Viaje a las zonas afectadas</li> <li>• Contacto cercano con una persona con un caso confirmado</li> <li>• El paciente pasó tiempo en centros de cuidado especializado o estuvo expuesto a otro grupo de enfermedades</li> </ul> | Sí                          |

|   |  |    |
|---|--|----|
| Requiere hospitalización con síntomas de infección respiratoria aguda (es decir, fiebre, nueva tos, nueva dificultad para respirar, mialgias, etc.)   |  | Sí |
| <i>* Poblaciones especiales: adultos mayores (años de edad &gt; 60), personas con sistemas inmunológicos comprometidos, mujeres embarazadas, insuficiencia orgánica, personas sin hogar o personas que viven en viviendas congregadas. Los trabajadores de la salud deben seguir la guía de su institución para los protocolos de prueba.</i> |  |    |