

Vacunas contra el COVID-19

Disponibles en el Condado de Ventura

Los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) amina a las personas a recibir la primera vacuna disponible.



Vacuna:	Pfizer	Moderna	Janssen/Johnson & Johnson
¿CUÁL ES EL TIPO DE VACUNA?	ARN mensajero (ARNm) Las vacunas de ARNm no contienen el virus vivo que causa el COVID-19. Estas vacunas enseñan a nuestras células a producir una proteína que desencadena una respuesta inmunitaria dentro de nuestro organismo. No pueden provocar COVID-19.	ARN mensajero (ARNm) Las vacunas de ARNm no contienen el virus vivo que causa el COVID-19. Estas vacunas enseñan a nuestras células a producir una proteína que desencadena una respuesta inmunitaria dentro de nuestro organismo. No pueden provocar COVID-19.	Vector viral Estas vacunas contienen una versión modificada de otro virus (el vector) para darles instrucciones importantes a nuestras células. No pueden provocar COVID-19 ni el virus utilizado como vector de la vacuna.
SERIE PRINCIPAL: ¿CUÁNTAS VACUNAS NECESITA?	2 dosis Separadas por 21 días (o para ser recibidas de 21 a 42 días después de la primera dosis) 3ra dosis Para personas inmunocomprometidas de 12 en adelante, 28 días después de la segunda dosis	2 dosis Separadas por 28 días (o para ser recibidas de 28 a 42 días después de la primera dosis) 3ra dosis Para personas inmunocomprometidas de 18 en adelante, 28 días después de la segunda dosis	1 dosis
¿QUÉ TAN EFECTIVA ES?	En mayores de 12 años, la eficacia es de 95% después de 2 dosis En niños de 5 a 11 años, la eficacia es de 90.7% después de 2 dosis	Eficacia de 94.1% después de 2 dosis	Eficacia de 66% contra infección de COVID-19 moderada a grave. Eficacia de 93% para hospitalizaciones por COVID-19. 100% de eficacia en la prevención de muerte por COVID-19.
¿CUÁL ES LA INDICACIÓN DE EDAD?	5 años en adelante	18 años en adelante	18 años en adelante
¿CUÁLES SON LOS POSIBLES EFECTOS SECUNDARIOS?	En el brazo donde recibió la vacuna: • Enrojecimiento • Hinchazón En el resto del cuerpo: • Cansancio • Dolor de cabeza • Dolor muscular • Escalofríos • Fiebre • Náuseas	En el brazo donde recibió la vacuna: • Enrojecimiento • Hinchazón En el resto del cuerpo: • Cansancio • Dolor de cabeza • Dolor muscular • Escalofríos • Fiebre • Náuseas	En el brazo donde recibió la vacuna: • Enrojecimiento • Hinchazón En el resto del cuerpo: • Cansancio • Dolor de cabeza • Dolor muscular • Escalofríos • Fiebre • Náuseas
¿CUÁNTO TIEMPO FUNCIONARÁ?	Actualmente se desconoce la duración de la protección contra el COVID-19.	Actualmente se desconoce la duración de la protección contra el COVID-19.	Actualmente se desconoce la duración de la protección contra el COVID-19.
LA DOSIS DE REFUERZO: ¿CUANDO SE NECESITA?	6 meses después de completar la serie principal	6 meses después de completar la serie principal	2 meses después de completar la serie principal
LA DOSIS DE REFUERZO: ¿A QUE EDAD LA PUEDE RECIBIR?	18 años en adelante	18 años en adelante	18 años en adelante
¿DÓNDE SE PUEDE APRENDER MÁS?	 5-11 años  12 años y mas		

No se requiere cita pero se puede registrar en: [MyTurn.ca.gov](https://myturn.ca.gov) o 833-422-4255

Para ver si califica para recibir la vacuna en su hogar, llame al 805-477-7300.

